



LÉPINOC

Versailles – 2023

CONTEXTE

VOTRE STRUCTURE :

Versailles

VOTRE SITE :

**Cimetière des
Gonards**

VOTRE HABITAT :

**Jardin avec espaces
verts**

VOS PRATIQUES DE

GESTIONS :

Inconnu


VOS SESSIONS LÉPINOC

2 sessions

réalisées en 2023 (2 en septembre). La deuxième session de septembre n'a pas été prise en compte en raison de l'absence d'observation de papillon.

34 photographies

DEGRÉ D'IDENTIFICATION DES INDIVIDUS



VOS RÉSULTATS D'IDENTIFICATION

49 observations de papillons de nuit sur le dispositif

11 espèces identifiées par l'expert lépidoptériste

32 individus identifiés jusqu'à l'espèce (taux d'identification : 65 %)

6 familles différentes et **14** individus identifiés seulement jusqu'à la famille soit 29%

12 genres différents et **1** individu identifié seulement jusqu'au genre, soit 2 %

2 individus identifiés seulement jusqu'à l'ordre, soit 4%



ZOOM SUR LES ESPÈCES LES PLUS OBSERVÉES

1



Aplocera plagiata
© P. Mothiron / lepinet

L'ESPÈCE LA PLUS OBSERVÉE (4 INDIVIDUS) : *Aplocera plagiata*

Similaire à *A. efformata*, la sous-espèce *terlineata* de répartition circum-paléarctique est largement présente en Europe, y compris en France, avec une préférence pour les landes et les prairies mésophiles. Diurne et attirée par la lumière, elle se distingue par une antémédiane ne présentant pas de pointe remontant vers le haut.

2



Carcina quercana
© plemos / iNaturalist

LES SECONDES ESPÈCES LES PLUS OBSERVÉES À EX AEQUO (4 INDIVIDUS) :

Euphithecia icterata : Présente en Europe et en Asie Mineure, elle occupe divers habitats en France, y compris en Corse. On la trouve dans des environnements variés, allant de la forêt mixte aux parcs et jardins.

Scopula marginepunctata : Répandue en Europe et s'étend jusqu'en Mongolie.

Galleria mellonella : Le Fausse teigne de la cire, de couleur marron et noir habite généralement les ruches.

Carcina quercana : Ce papillon est commun dans les zones bien boisées.

3



Eilema griseola
© P. Mothiron / lepinet

LES TROISIÈMES ESPÈCES LES PLUS OBSERVÉES (3 INDIVIDUS) :

Eilema griseola : La Lithosie grise se distingue par ses ailes larges et sa forme ovale au repos, avec des ailes antérieures grises et une fine bande jaune sur la côte. Elle habite les bois humides, les tourbières et les falaises marines. Les papillons émergent entre juin et août.

Hypsopygia costalis : Le Pyrale du fourrage, aux teintes marron, jaune et rouge, est présent dans les jardins, les bois et les champs.

Source : Oreina, Picture Insect



MOT DE L'ÉQUIPE LÉPINOC

Olivia, Lisa et Gahene de l'équipe Lépinoc vous remercie d'avoir contribué au programme en 2023. En effet, cette année a été riche en observations et en identifications grâce à vos participations. Nous espérons donc vous compter dans notre réseau pour l'année 2024.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur notre adresse mail : lepinoc@noe.org

